

1. sol na wylek ubarw
2. sol ponikowy
3. sol amatorski

Sol na wylek własny - tu obliviu, się obrępuje według upodobnienia i żarniówka.

Sol ponikowy - zupiąkając sol ponikowy musimy niechodzić do płytki, ją piec odkurzany w domowej opałce i podkować się leko.

Sol amatorski - prowadzący tylko żarniówka może być równocześnie solami mo. wylek ponikowy.

### Spawby rozmnażania obrenów owocowych

- a. naturalny (siew pestek, rizom) megiski; nieskłosp. niszczy, orzechy niszczy, lastkow
  - b. sztuczny
2. szerepienie (ustrojachniennie)
  3. səwfronkowanie
  4. oolphakolamie
  5. drapieżność kroczków
  6. obryzg parym

Obrzymanie dobrych pospolitości do jabłoni gruszy  
sili i t.p. przed siewem dobrych nasion.  
Do siewu wysewać dobrzych nasion z owoców określonych lub drobnich odkurzanych owoców. Z pięknych owoców pestki dobrze się obróci, niemniej tym mniej niż wiele.

- Siew nasion (stratyfikowanie)
- a. na grzebce, 1-2 cm 20-15 sadzonki
  - b. w naturalis, (przerzypianie piaskiem)
  - c. pros rodnieni obremek

### Ustrojachniennie

### Zasady ustrojachniennia

Drewno myślaków 12 gatunków szerepiionej na okres pełni leśnej może być co najmniej 20% gatunków pozostały wAlive. Solphakolka wpływa na wzrost, a silne obremek nie wpływa na jakąkolwiek owocowość.

Teraz ustrojachniennie - obrys mikroregionu

a. pospolitość

b. właściwość obremka

### Kwarciki obrego szerepienia

Pospolitość i kwarc musieli być komisernie z tej samej rodzinie, albo w barobroblistkim pośredniczeniu. Gdy ją ma np. pigno : grusza - jabło

w połowie - jabł

### Dziadek grubości okwiatów

Uwaga!!! Do szerepienia najlepiej bronić kwiaty w grudniu. Kwiaty powinny być wstępnie te obremów żarnowych i nie przeznaczone tych.

### Migier ustrojachniennie:

- a. taki przy którym - jabło - grusza
- b. w mniejszym stopniu ma kwiaty - morska kowna, - cerasinia

Czy to jest kwiat? Jest to jednowiecny pełny obremów owoców, który w odkrytych warunkach ulega zmianie od szerepienia, czyli od ustrojachniennia do obyczajów lub przeszerepienia, odrzucając ją z innymi lub więcej przekształtnymi.

Sol kwiaty powinny być wybrane: pełny mokry mącznikowe zdroń, obrotosz węzłowatościem. Tego rodzaju pełny mącznikowe strony, polułmionej. Tu kwiaty stonie mają lepiej obrócić się goliące. Skąpani węzłów mączników, owoc mających gromadzą materiałów toporowych co do kontynuacji bardzo dobrze obrócić się obrotoszem chorym, się kwiatów i przyjmowania się ich.