Po upływie kilku dni na twarzy wysypka bieleje i więdnie w miejscu gdzie pierwotnie wystąpiła, wreszcie znikają wszystkie plamy w tym samym porządku w jakim powstały. Z komplikacji często zdarza się zapalenie ucha środkowego z ropieniem i przedziurawieniem błony bębenkowej albo zapalenie płuc lub oskrzeli.

Idoklusz

Jest chorobą zakaźną mającą miejsce u dzieci od 8 roku życia zwłaszcza dorosłych. Choroba przenosi się od dziecka do dziecka przez wykaszlenie kropelki z błony śluzowej płucnej. Idoklusz występuje często po odrze. Choroba rozpoczyna się często od objawów zwykłego przeziębienia od którego nosa i kaszlu.
Po 10-14 dniach występuje po okresie trzy kolejnym okres kurczowych napadów kaszlu.
Idoszel kończy się z sinicą. Zabieg ciężkochorych trzymać w łóżku. Łóżko i pościel koszulę dziecka można skropić olejkiem terpentynowym lub eukaliptusowym. Okład z gorącej wody na piersi często uspokaja. Na tydzień zimne okłady. Potrzeby lekkostrawne.

Dyfteryja - błonnica. Jest to choroba zakaźna spotykana u dzieci w wieku 2-5 lat. Ale i w późniejszym wieku też zpotykany. Ze osesków występuje zwykle w postaci błoniczej nosa. Zarazki błonicy dostają się zwykle przez jamę ustną do gardła zdrowego człowieka stąd do migdałów. Okres wylęgania choroby wynosi 2-5 dni. Zaczerwienienie i obrzęk migdałów, na jednym z nich tworzy się biały nalot, błonka dyfteryczna. Z ust wydziela się wodnista

płynna, kwaśna wiec. Zabieg zastrzyknięcie Szkarlatyna Płonica.

Choroba występuje nagle zwykle z gorączką 40 stopni i wyżej, wymiotami i ciężkimi objawami zaburzeń ogólnego stanu, niezwykle silnem zaczerwienieniem gardła powiększenie migdałów. Język obłożony. Pojawia się wysypka na szyi, piersiach, udach, obej mnie w krótkie całe ciało. Oczy, nogi górne podbrodek, są wolne od wysypki. Po 5-7 dniach znika zupełnie. Stanowi powstaje łuszczyć, sepodrzę często dużymi płatami w mnie trwać niekiedy kilka tygodni. Gorączka zawsze na opadać. Komplikacje są ciężkie

Zabieg - niezwłocznie chorego, z łóżka niemożna wstawać wcześniej niż po 3-4 tygodniach. Potrzeby łatwostrawne.

Budowa narządu wzroku

Gałka oczna tkwi w dołku tłuszczu na podściółce tłuszczowej, umieszczone jest za pomocą mięśni prostych i 2 skośnych oka. Oko składa się z 3 zasadniczych warstw,

tunika/białkówki
naczyniówki
siatkówki

Przednia odcinek białkówki nazywa się rogówką. Naczyniówka przechodzi w pierścieniowy mięsień rzęskowy, warstwa ta nazywa się tęczówką otaczającą źrenicę. Naczyniówka odżywia oko, obsługa nerwy krwionośnych. Siatkówka utworzona jest z nerwu wzrokowego, tuż za źrenicą i tęczówką tkwi soczewka oka. Soczewka leży w delikatnej błonce, tworzącej worek torebki w niej zawarta