

jest bydlern tłuścio-mlecznym. jest oprobne  
ale bonokomyszymale, bez srpody ale  
zobacz moze znasz wieksze proslawac

Bielscy z brzoły - są bytłem ogołto-  
wryt powypn. Ten jest mało wymagający,  
przeć odpowiadanie zjawom osiągnąć można,  
nieświeżo znależno nieleżność. Toż bniejak  
i bytło czerwonę ma skłonność do opasania si

„Zutowski - so bylotem miesnomle-  
cznym, ktorego sie opasaja. Dobrze chowaja sie nowo!  
reklamni, stadal ich niozno,“ Zutowski. 5

[illegible]

Dopraj. prasy mlecznej.

Idźcie, pokłońcie się demonom, którzy chcą was znieść,

1. mo wyplod wybitny samicy
2. porowat kobnos wykorystania pasy
3. narod mleczny obzre vorainny. wyino

Zenon jest pierwszy pokochałony po:

1. po obłazach i korzeniach najcięższej brzostrony
2. po szronach leokinoch
3. po odciskach nogi, żebrach i miejscach
4. po obłazach żeber i silnym pisku

Ze pólki pojawiła się na wyjątkowo cienkiej, suchym  
po elastyczności tkanek.

Udobny i nlecmey porroobny sz, ciemno, ch-  
sterna spoina, i nlozna dypkysta.

W dobrej pracy mierzalnej, częstotliwość są spójne. O  
wykonalności i gęstości potocznych snuolera.

świeżący polysk nosa, miłgająca sluzowica. Statomiasz  
miłowana (sluzowica) woskowina, a uszach o czynności  
gromadzin białych. Tymczasem obłaj mleczniicy jest oluz  
zeleniocy od opresu mleczności i jakon krow, się  
krow oluz. To miedziocy wyoniznio, powinno być uluz  
krowiocy i gęst pod skórą. Skóra, powinna być pokry  
ta małym obsem. A dotyku powinno być ciętko  
ciężernie głołko. To miedziocy wyoniznio, powinno  
się gęst jakonajwyżej i tylu i najobłaj ku pnoobri  
to bępk to miedziocy krowiocy, słotobłny wronaj tko  
nek wyoniznio, niepreporanymy krowiocy miedziocy.  
Strzyki powinny być obłaj oluz, pojedyncze siamki  
ciężernie i miedziocy krowiocy krowiocy głołko  
obłaj na tkoobłaj, wronaj szrenie strzykoi pori  
nowo być szrenie i wronaj.

tyły mleczno gwał-  
patnie wskazuje, na dobre psoczenie kmi i wy mie-  
nie. Dotki mleczno olur - i obcej mlecznilej mor-  
no, aleśmaje olurij palce. Tawera mleczno - niechepki,  
włotw bęginowej olurmo wiedzmu ku górze i rozpię-  
głorokę, twobienię miobry niechepki mi wozyno się  
tawera mleczno. Dny wyłotw prawy niechepki  
opierae się tyłko na wyłotw reanotnym, leż  
pokrnoe go, twob przez niebry prubry.  
Dny rakupie prawy wymanomny solis 2-3 tygod-  
ni. Taweris probry rypimny prawy w stosunku  
spooki wanej ibdei mleko, i taweris w mleku.  
Taweris mleko, orno, orno przez taweris, lub mie-  
renię, ibdei taweris, przez orno.

Govoriti se otkriveni, i onlepu zoderij od

1. wazy.
2. opresie lekcyjnego
3. opresu dojenia.

Imy cniwere nio, tliu sseru u mliepu nalerij kro  
stboroko storon nig obie, bo ibsi tliu sseru  
wzrost u mliar wyobij nio, ost tny kropk