Pielęgnowanie krowy cielnej.

Stanowienie krowy odbywa się w czasie jej latowania się. Latowanie krowy poznajemy po jej zachowaniu się. Staje się niespokojna, mleko jest ona pić, strupa innego bydła, obskakuje ją i chętnie daje się obskakiwać innym krowom. Latowanie się może być spokojne lub burzliwe trwa od 48-72 godzin. Od czasu latowania się krowy spokojniejszego należy z pewnością uważać by nie przeoczyć tego okresu, który trwa 24 godz. W dobrze żywionej jałówki pierwsze latowanie się może nastąpić już w 7-8 miesiącu życia, potym powtarza się co 3-4-6 tygodni. Dojrzewa dopiero wtedy kiedy ona osiągnie 2/3 wagi swojej matki, a wzrost ustaje dopiero po roku życia.

Krowa po ocieleniu hoduje się po 3 tygodniach, niedopuszcza się jej jednak zarok należy przedłużyć ten okres dłużej jaknajdłużej, przynajmniej do 3 miesięcy, a to w tym celu by krowa jaknajlepiej rozwinęła, a tym samym przedłużyć jej okres użytkowości.

Stanowienie krów powinno odbywać się w miejscu zacisznym, suchym, równym, lekkim, przestrzennym są poręcze używane do stanowek które są pożyteczne wtedy kiedy stadnik jest zacięty i obawiamy się o obciążenia krowy lub jałówki. Stadnika pisklerać się powinno na otwarcie.

Powtórne latowanie się krowy może być po 3-4 tygodniach lub też po 3-4 miesięcy

Jeżeli latowanie powtarza się co pewien czas to należy poradzić się lekarza weterynarii.

Po cieleniu krowy pozwalamy jej zachowanie się. Staje się ona powolna i spokojna. Bezpośrednio po stanowce krowę nakarmić niewolno, jej pozwolimy i nieobawiać jej karmy wynoszą przez rozwalenie, bo te mogą wpłynąć szkodliwie na jej dopiero rozwijający się płód. Dobrze jest dać krowie pojść z otrębami siemienia i nakarmić ją dobrym sianem.

Pielęgnowanie krowy cielnej polega na usunięciu jej życia i otoczenia aby jej zaszkodzić mogło. Chronić ją przed bodźcami, ostrymi kroczami, potrzaśnięciami, uderzeniem, upadkiem i t.p.

Przy żywieniu unikać należy nadpsutych pasz, zgniłego siana i t.p.

Rozwój cielęcia w łonie matki i żywienie jej ciała w łonie matki w pierwszych miesiącach rośnie bardzo powoli natomiast siły jego rozwój przypada na ostatnie (miesiące) tygodnie bo przybywa okiemnie około 3/4 kg.

Wskazówki: 1. W pierwszych miesiącach ciążowości krowa najpomalutku żywiona niepotrzebuje dodatków paszy na rozwój cielęcia.

2. Już od 3 miesiąca należy jej dodawać na rozwój cielęcia stopniowo by w następnych 2 miesiącach otrzymała dodatkowo tyle paszy ile jej potrzeba na wytworzenie mleka, 4-5 k.

3. 7-8 tygodni przed ocieleniem należy krowę zasuszyć, gdyż dojenie krowy ujemnie działa na potrzebną ilość mleka,