toserki gruźlicy.

Rozbroje gruźlicy.

1. gruźlicę płuc,
2. gruźlica - opłucna lub też otrzewna, zapęcie
3. prosówka - gruźlicę nie krwi i z krwią przechodzi, jest się do poszczególnych komórek organów. stąd gruźlica kości, skóry i t.p.
4. gruźlica wyrzutnia, to przybiera odpowiednią formy, jak:

a. formą ograniczoną na wymienin tworzą się guzy miękkie, zimne, nie bolesne

b.) mięsowa obejmuje pęcherzyki i kanaliki gruczołu mlecznego i wyściela je jako nalot - wyjątkowe gorączka.

c. prosówka rozrzucona w tkance łączny i tworzy, tworzy się mnóstwo, zerwała i przez to rozszerza się choroba. Płynie całą zapęcie (podgrzone) powiększone leży nie bolesne.

5. gruźlica mózgu.

Zapobieganie rozszerzenia się choroby - podejrzane sztuki oddać badaniu przez szczepienie rozpoznawcze, natychmiast je odrzucić od młodzieży i zdrowych sztuk. Jeżeli choroba nie da się już wyleczyć sztuki takie po uprzednim badaniu i zarządzeniu lekarskim poddać ubojowi. Bydło przebywające w czystych i jasnych mieszkaniach nie zapada na gruźlicę, chyba że przebywa z chorymi sztukami.

Dyfteryja - jest to choroba przewodu pokarmowego przeważnie jelit cienkich i grubych. Atakuje bydło do mocno rozpoczynają się zaburzeniem w odżywianiu i biegunkami. Błony śluzowe ulegają skłonnemu zgorzeniu i zapaleniu, następują silne biegunki, zwierzę traci apetyt nie przeżuwa, bardzo silnie chudnie choroba trwa 7 - 14 dni.

Dyzenteryja - decrenie 1 łyżka kreoliny na 3 l wody do wypicia 2 razy dziennie.

Dyzenteryja świń - jest to choroba bardzo zaraźliwa, wywołana przez bakterje gruźlicy. Występuje jako silne zapalenie błony śluzowej, jasnej, ogłonowej, jelita, nogą, kończyn górnej części tylnej, z rozpadem przemian się pokrwi i wonoji, który ma żółty nalot. Występuje przytym zapalenie gardła, tchawicy i oskrzeli, duszności i kaszel.

Leczenie - pędzlować jasną ogłonową rozcieńczonym roztworem tannyny z alkoholu jodyny, lub 1-rozem borowym. Chore zw. odrzelić od zdrowych.

Zapalenie wymienia. Przyczyny zapalenia.

1. zapalenie bakterjami zapalenia wymienia.
2. zakażenie innymi bakterjami, np. różnymi, zapalenie płuc gruźlicy promienicy i wszystkimi bakterjami gnilnymi, ropnymi.

Najczęściej występuje zapalenia wymienia bezpośrednio i po porodzie. Wymię jest przekrwione spuchnięte i bolesne. Należy je smarować się rozchodnikową lub borową, nawet czystym nie solonym tłuszczem, opłukać i zapajać mleko choćby co godzinę. Jeżeli obrzęk jest bardzo silny to należy koniecznie dać opaskę z prześcieradła.

Dawać przytym okłady z ciepłej krzaśnej wody lub serwatki, wymię smarować maścią kamforową 3 razy dziennie mleko ciągle zdajać.

Zakaźne zapalenie bydła - choroba chroniczna bardzo silnie zaraźliwa, wywołana przez bakterje Bangna. Konieczna powiadomienie.

Choroby owiec - motylica, jest to pasorzyt w postaci listka. Żyje w przewodzie żółciowym owiec, bydła, koni i świń. Dojrzały robak ma 2 cm do 1,5 cm szer. Rozwija się z jaja wielkości ziarnka piasku. Zwierzę zakaża się przez zjedzenie ślimaka zwanego zarodnikowego znajdującego się w źdźbłach trawy.