Cielę samo musi być zupełnie zdrowe. Obfite zbu-
dowane o mocne przynajmniej 1/14 kg swej wagi.
O obfitym rozwoju cielęcia świadczy obfite że bóro.
cielę musi mieć zdrowe po urodzeniu 4 - 6 żeber
jeżeli ma tylko 2 to świadczy o słabym rozwoju fizycz-
nym. Sam wygląd zewnętrzny niedaje jednak pewności
że z cielęcia dorosłe mleczne krowy. Zdarzyć to jest
prawie w każdej od sposobu żywienia i właściwości
innych indywidualnych cieląt. Najlepszym zdaje się być
system pojenia, przy którym zwracać po urodzeniu
cielę oddzielony od matki. Żywimy je początkowo
samym mlekiem potem przyzwyczajamy do suchych
pasz.

System pojenia pozwala następujące
cechy

1. po oddzieleniu cielę nie łączki zwracać
   do matki na cielęcia
2. prawe wyglądają się obfitowanie i można ob-
   serwować sposób żywienia, ob wymagania
   organizmu, można się obeznać z jej proble-
   cji mleka
3. można swobodnie regulować ilość mle-
   ka dla wzrastającego cielęcia.

Cielę powinno być obfitować mleko od swojej matki
ale wobec niedużej ilości to przynajmniej obraz
tygodniowy. W potym od innej strony. Ze względu na
bardzo małą pojemność żołądka cielęcia obejmuje
stopniowo a ilość mleka do picia.

1 go dnia	1	1/4	litra
2 go	"	2	"
3 go	"	3	"
4 go	"	4	"
5 go	i 6 go	po 5	litrów
7 go	"	5-6	litrów.

trzech

Dziennie ilość siary obliczamy w pięć razy ob razy
na 5 razy następnie na 4 w pierwszych tygodniach
na 3 i dalej już wchodzimy do normalnego trybu
żywienia. Cielę powinno dostawać 3 - 5 - 6 (ilość) tygodni
pełne mleko przynajmniej trzy tygodnie, po upły-
których jeżeli musimy urwać mleko pełnego to dodajemy
mleko odtłuszczonego, musimy w miejsce tłuszczu
siedzenia lnianego w ilości 45 dkg dziennie. Dobrze mleko
obfitować ob mleko, można też obfitować przez słodzenie
w ilości 1 łyżki dziennie. Siemię rozpuszcza tłuszcz ob
przez przyczynia się do trawienia i wzmocnienia, pozo-
stawiamy wyjątkowo cielęcia mleko odtłuszczone. Ono zre-
szcie przyzwyczaja, powinno się mu dobrze wody do
picia, zmieszanej z mlekiem. Cielę już od 3 tygodnia
powinno się przyzwyczaić do jedzenia dodając mu potro-
szę gniecionego owsa i dobrego siana. W 9 - 10 tygo-
niu można mu zmienić pasze na bardziej pożywną
złożoną z

4 części mocnego lnianego, 2 części
otrąb pszennych

2 części suszy bobikowej 2 części
owsa.

Po ostatnim usunięciu mleka pasza części
na dziennie powinna wynosić 1 1/2 kg.
W tym okresie należy cielę przyzwyczaić do jedzenia, mo-
chu pastewnej bówrapów, liczyć do pościel, do 1 go roku
życia, 8 - 10 kg dziennie.

Czynności istotne.

Oprócz wyżej opisanych spełnia niezbędnie pew-
ne czynności, niezbędne zupełnie od wyżej
cia, a mianowicie

1. Ubranie 2. Krzesanie 3. Oddzielenie

mie