

umik. naci. Zmniejsz wskutek kulturalnego
nowie chołbici, plusnie, tro, ci miedzi. Po 40 dniach
nie roznyma sie po 8-10 dniach. Cile nie
nie stopnia zakazanie bakterij i nie roznyma
oko 3 tygodni z miewa ruznicie roznice.
Spierzenie i zmniejsz 2-3%

Siemantelmas 2 mierz 2-3
Z psche ry plyn miorowey obstar je sie ob ps-
che ry ko w plicnych, wyznajcie rachty stone za
podanie plic - smiere. Podobnie jak w jamie
ogbo nej w jelitach tworzą sie wrzody, te zaraka-
nie przez miorowę potworkow pojmowaja
sie w jelitach, stąd krowine biegunia.
Gdy zarys obstar sie teri do wymienis, kiedy kro-
w lezy, wymis sporow na chorych nozach
Jawno, more teri krowe wymis i w ten sposob
zaradzie lub teri obstar wstetec nie ostw i nasei
more pienie sie chorow na rzach, co prawem
na stopnie rapalenie pierski nozowej u nasoi
dy wojon i nacie, more nastapic ich odpool-
nisc. more teri na stopnie rapalenie kosi.
Gielegno wamie z mierz chorych na przyory

Baroko moringa neorg je st odrymagine chonyer
sruk. i utrymagine ich. orob obotynupseyt.
je i pome. poren i namistk prej cry sto sei.
Chore mnyez pome mync 4-5 mory drien.
nie. 1. nobla ut leni mone, 1 ty ita mone sakan-
ke pome pto, i mone mone

2. *goolyong* 1 " "
3. *knawsem bonowym* " "

Wate lub 2 matki blong porany many us-
lery, zamar spalic, pored prooien stojon
among cry astanek moogy mooy obetree
potonci arek p nepojony obiekien lub
terem Dobye, fer, ter, raice songwongi te-
nem lub obiekien.

Przy przerywaniu moim na stronie szerepienie
ochronne lub zakochanie, czy też sermonek
wskazywać chorej kromie, do jej myśli bo nie
i o bieżącej obywateli, a ten sposób się
ja rozważa. Słutki, które kładą się chorek poraża
drug.

Choroba banobro rakowina. Rakowi lirow. Zawa-
rek wynotuje rozprzecznie ugeru i kimpety-
eranych w plucach; wynotuje zapalenie pluci
i opłucnej. Zwykle trwa 3-6 tygodni
Zwierzę po przebyciu choroby wyróżnia się od nor-
malnej w ciele i w. Zakazanie przychodzą
choroby rakowina krapelkonoj. Wzrostu lewni
choroby na chore zwierzęta przy oddechaniu
Temperatura 42° pojawia się znowu korek, olu-
szenie, przy obłożeniu ból w podbrzoju
Zwierzęta zapuszczają ostry zapach, z nową
wzrostu krowa cięci, brak apetytu, zatory-
mnie apetytu, porażenie. Wydzielanie
zupetnie z moczem, zupetnie z moczem mleko
Choroba trwa 5-6 tygodni i więcej, potem nastę-
puje powolny powrót do zdrowia, okres nekro-
tyczny i śmierć trwa do kilku miesięcy. W podobie
o plucach w podkach moru o to samej samej

Gruźlica - jest choroba zakaźna i zaraźliwa.
Wynikająca przez łoskoty gruźlicy. Brońca wy-
nika jest przewód pokarmowy i obojętne.
Zwłaszcza zakażenie jest choroba zakaźna (tęże-
nie zwierzę, krowa, świnia, kura, owca i człowiek).
Wieloletnia zakaźność się przekazuje pokarmem.
Bydło przy molojacji i na pastwisku. Naj-
częściej zakażenie następuje choroba obojętne przez
zakażenie kropelkowe - w prosty linii zarażenia
się kropelki podłoża od błędnego zwierzęcia 1-1,50 m
na bok do 2 m. zakażenie pyłem zarażającym