Najwyraźniejsze to że słoma jest trawoko i bydło więcej jej wyciąga pod nogi, niż zjada. Traci przez to gospodarz podściółkę.

1. Chowa swoje bydło a zdaje się o tym mało wiedzieć

2. marnuje słomę którą można znacznie lepiej wykorzystać przez jej zakiszenie.

Zakiszanie siecki - słomę pociętą na gruby siecznik wsypuje się do beczki. Zalewa się ciepłą wodą w której można rozbić trochę kwaśnego mleka. Ubija się siecznik i bok zostawia się otwarty. Siecznik zakwasza się kwasy się w niej kwas mlekowy który nadaje jej miły smak kwaskowy i zapach, przytym zmiękcza siecznik. Bydło zjada ją chętniej i w większej ilości. Ujemna zakwaszania słoma jest mało wartościowa jest paszą tylko bijętościową. Część wokrzyczych pożywa bardzo mało dlatego koniecznym jest dodawanie w tychże w postaci otrąb, makuchów ospy inaczej mieszanie które znacznie opodnie

Wiosna krowy na pastwisku.

Pasza zielona na pastwisku jest paszą pełnowartościową. Jest paszą soczystą, stąd bydło po wypędzeniu na pastwisko w pierwszych dniach cierpi silne rozburzenie w przewodzie pokarm. By uchronić bydło przedtem nie pozwolimy się bydła wypuszczać na pastwisko wcześniej, lecz po południu i przed wypuszczeniem dawać mu słomę sianą lub z ręsionką z paszą zielonką. Słoma jako pasza sucha, trawoko otę pożywa wymaga bardzo dużo wody dla rozmiękczenia, zabiera się wodę z paszy zielonej, chroniąc tym rozwój zwierza przed rozwodnieniem.

Pytania: w jaki sposób można dobrze wykorzystać słomę przy jej skarmianiu bydłem

Czym powinniśmy pamiętać żywiąc bydło obficie słomą

Jakich powinniśmy bydło dodawać?

Jak zachowuje się bydło po wypuszczeniu na pastwisko na wiosnę.

Czym powinniśmy pamiętać i czego przestrzegać.

Opasanie bydła.

Dwa rodzaje zwierząt podajemy opasaniu

1 młode i 1-2 letnie

2 starsze użyte do produkcji jak krowy, stadniki i bydło robocze. Lepsze jest mięso młodych zwierząt. Dla podobnych opłaca się lepiej tuczyć zwierzęta starsze. W przyrodzie młodzieży daje więcej przyrostu dziennego ale na przyrost ten musimy dać o 60% więcej od wymagającej ilości białka, przy opasaniu zwierząt starszych. Stąd opas młodych sztuk jest znacznie droższy i opłaca się tylko wtedy jeżeli są specyalne wysokie ceny za takie sztuki. Dla opasu równo się przerwowej sztuki nierbyt stare, zgrzebne, odcinając je porządnie zewnętrznym i pożytecznych. Starsze sztuki najlepiej opasać w wieku od 10-12 lat. Im zwierzę było lepiej żywione przedtem, tym okres tuczenia będzie krótszy.

Przy opasaniu chodzi nam głównie o przyrost wagowy, który dziennie powinien wynosić 600 - 1000 g.

Krowy mało dojne przeznaczone na rzeź powinny dostać w j.k. do 80 g białka.

Woły starsze - dajemy tyle białka by zaspokoić potrzeby w j.k. 80 g.

Pasze okopowe opasowe - te dają się w znacznych ilościach na 100 kg ż.