

na roli 4 sierpień - ... 2 kg tymolki na 10 kg ekoni.  
na piórnicy 2 " 2 kg tymolki na 10 kg ekoni.

8 kg konieryny  
3-4 " tymolki i trójgron owocki  
1 " kostrowy łakony

Najbardziej zła roślina przysiadła konieryna jest  
jest podobna do obrotowej nasion, widać, że  
zob. kamienki i rybniki.

Flis konieryny - plon konieryny ołowianej  
wynosi około 80 g z m. siemna 1 a poszy zielony  
4-5 razy więcej. Flis konieryny ma wyrostki  
około półtora centymetra. Koni nie je głównie lub koniar-  
ka, mogą się przez

- a. przekopanie
- b. na wyrostkach czyli ostrożeń
- c. przez kwerkonanie.

Nasiona - ogólnie, na obrotowej pokosie masy  
nie ma cel woskowiny. z 1 ha otrzy-  
maje się od 200 - 600 kg ziarna.

Choroby i szkodniki - Kamienka zająca koni-  
erynowa, wryki nitki, uszerńca odra, konierynowa  
wryka wryki mowicie polne.

Konieryna biała - jest rośliną pastuszkową, ma-  
rośnie się od siemna w nasionkach na siewie past-  
uszkowe. W wrystym siewie wyrastają 6-8 kg masy  
z 1 ha ołow 20 g.

Konieryna biała obrotowa biała i konieryna  
szarekta - inkompatybilna jest rośliną jednokrotną

Lucerna - jest rośliną wieloletnią, daje bardzo  
dobry pokos zielony lub suchy. Substancja  
nie zawiera w napno, przepuszcza i dobrze ma-

merionej. Wielu ziemi pod mokłą, zimną, ilorotą  
określa się plon owoce w średnim roku. Wyrasta się  
18-24 kg na mowę na 1 ha 25-40 kg. Plon  
owoce ołow 120 g z 1 ha. Daje 4-5 pokosów, lubi potęg  
przed mowem nawozem w jesieni, albo nawożenie  
krajmitem i tomasyną.

Lucerna piaskowa - Lucerna chrniełowa.

Wodaje się na podsiemnie łak i pastuszk, może  
być nasiona w. z łak po jego 4 liście owoce mowa,  
15 g z mowa 1 ha, też przynosi jako nawoz zielony

Lucerna szwedzka - wodaje się na podsiemnie łak  
Espareta - wodaje się owoce mowa z

trawami, ma glebach bogatych w wapno  
na 2-3 letni wrytek. Wyrasta się 80 kg na 1 ha.

Flis siemna wynosi 40 g z 1 ha.

Bobik - wyznacza ziemi łakowej

w napno. 4 sierpień i 4 sierpień w składowiki pokosów.  
Dobre owoce ma, sierpienich, optymistycznych glebach, lecz  
bogatych w próchnicę. Woduje udaje się toń

opóźnienie rośliny motylkowe nie woduje się lub latem wy-  
stępuje, Bobik najlepiej uprawiać po owoce lub jęcz-  
mień. Jest obrotową przedplonem pod siemną

bo owoce ziemi z chrniełową i uszerńcą za wstę-  
plunki pokosów. Bobik nie je się w obrotowej,  
a przez niego, lubi stony mowa, przynosi mowa

Uprawiać, roli i mowa. - Rola pod  
lubić powinno się owoce jęczmień i to naj-  
piej na ziemi. Oile obrotowej owoce mowa

to dobre jest owoce mowa, ziemi na przynosi w  
pole, a obrotowej mowa w mowa. Na 1 ha daje  
się około 40 mowa pokosów, jeżeli w owoce

brock na pna, to dobre by było jeżeli w owoce  
wapnem. Siemna - owoce mowa bobiku przynosi

się owoce mowa owoce mowa owoce mowa, bo siemna  
na mowa mowa przynosi. Jeżeli się bobik

na mowa mowa przynosi.