bydło nie. Wysiew: na się do 25 kg na 1 ha.
Nostrzyk biały wysiewa się 35 kg na 1 ha, jest dobrą paszą dla owiec, może też być przyorany na zielony nawóz.
Seradela – jest roślina jednoroczną, siewa się ją w życie lub owies. 40-50 kg na 1 ha 24-30 dni siewy. Najlepiej udaje po okopowych w pierwszym roku po nawozie. Seradela rośnie bardzo powoli. Dopiero po zbiorze zboża zaczyna rość. Wreszcie zasiewa, nie korzystna daje w sierpniu dojrzałe nasiona. Seradela udaje się na każdej ziemi. Nie przyjmuje tylko ziemi bakterji korzeniowych brak wiązek. Radzą na to posypać po polu ziemi trochę na której poprzednio rosła seradela. Seradela na siano zbiera się w sierpniu, później może jeszcze zostać do odrośnięcia, wówczas daje jeszcze pokos zielony.
Zbiór – Seradela wydaje 250 kg z zielonej paszy i około 50 g siana z 1 ha.
Nasion można zebrać 3-6 q z 1 ha.
Mieszanki, trawy i koniczyny – Do wysiewania z koniczyną na paszę nadaje się następujące trawy:
Rajgras włoski – na 1-roczny wytrzyk wysiew około 25 kg sam trawy.
z koniczyną – 7-12 kg. Kłócić trzeba wcześniej niż koniczyna zakwitnie, bo rajgras traci.
Rajgras angielski – nie, wcześniejszy jest trawą trwałą udaje się na trwałe pastwiska. Im wcześniej jest sprzątany lub porosły tym lepiej się krzewi. Wysiew samej trawy około 40 kg na 1 ha – na 1 morg 24 kg.
W mieszance z koniczyną daje się 10-15 kg. Do dobrego rozwoju wymaga znacznej wilgoci.

Kupkówka czyli trawa kupkowa – wymaga gleby zasobnej wapnia.
Udaje się dobrze wysiewania z rajgrasem włoskim i angielskim, esparcetą i lucerną do korzenia i sprzątania.
Owies wysoki czyli rajgras francuski:
Na glebach bogatych w wapno daje obfity plon. Rośnie wysoko, wierzchołki opadają, jest trwały. Samej trawy wysiewa się około 38 kg na 1 morg.
Udaje się do mieszanej z koniczyną lucerną, esparcetą na kilku letnie korzenne łąki.
Tymotka – udaje się na wszystkich gruntach z wyjątkiem podmokłych i torfy. Rośnie wysoko i daje dobrą paszę. Po okaszeniu krzewi się. Sieje się ją zazwyczaj jako mieszankę z koniczyną czerwoną na lepsze żniwne grunty, a na podmokłe z koniczyną szwedzką w ilości 16 kg, koniczyny 3 kg tymotki.
Znaczenie roślin motylkowych jako pasza.

Uprawa motylkowy na paszę.

Koniczyna czerwona – gleba – koniczyna rośnie od dobrej bogatej ziemi bogatej w wapno i dosyć wilgotnej. Najlepiej udaje się na gruntach średnio żniwnych jak też bogate w wapno – nie lubi podmokłej kwaśnej ziemi. Suchych piasków i żwirów.
Koniczyny nie powinno się siać częściej jak 5-6 lat po sobie.
Wysiew – koniczynę wysiewa się jak najwcześniej w ozimin i przykrywa się lekko z ogłaszczy bronią. Jeżeli wysiewamy zbożem jarem to poroślowiemy bez przykrycia.
Ilość wysiewu – na 1 morgu wysiewa się 12-15 kg na gleb żyznych sieje się mniej, sieje się koniczynę z trawami w ilości: