

3. Srobremit pool kinasnik - robic moze na knalku
w miejscach stuzio wozu staje sie ziemniaki
i przykrywa plucikiem. Tuz na stopnej obrobce moze
na przejerobac plewnikiem i plucikiem wszed
w zoliz.

Dalszymi warstwowi jest brązowanie ziemniaków. - do tego celu użyje należą lekkiej brzozy. Następnie trzy razy się ziemniaki 2 razy w odstępie 2-3 tygodni. Na grzankach lekkich i mięsnych ziemniaki gotowane lub obryzane. Należy je tylko skrobić dość głęboko i potem ziemie truszczyć. Skroblonymi albo ziemniakami jest ziemie skórki ziemniakowych - one faktycznie skrobi ziemniak, oraz i kaciemyśmy okabotki solominy. Kiedy się to ty porbiem, wówczas solominy gotuje w bulwarach i ziemniaki nie są smaczne. Ziemniaki ziemie się dopiero wtedy gdy były się i zupełnie suche, a ziemniaki obryzane. Ciepły rano praca się po zbiorze. Kopie się i ziemie lub masy - one. Ziemniaki przechowywane się w kopcach i ziemniakach. W rolnictwie występuje różne odmiany ziemniaków. Uprawa ich należy przede wszystkim do uprawy i od warunków miejscowych.

choroby niemniakais.

Chowby niemińskie mogą być wykonane przez
mieszkańce i przedsiębiorców, nawet przez miłośników
chorobowusztwa przez bark łępe i grybię
Stożki też być objęte chowbami, ale nie służyć
Chowby mikroskopowe - morawikowicie - tęguch
pomawszczona
silna
licznicowa

kochieranku,
 smog, rośnię
 II. wyrośnię przez bakteryj
 trójrajne gniecie kłobów,
 "trójrajne miętki" przy chromieniu kłobów nas.
 rośnię płomistości miętkisze kłobów,
 trójrajne poruchy ziemniakowe,
 pościsłe " " "

III. Grybice - ~~nowy~~ ciemniakowy, ciemno-
brzyzgowy, ciemny,
niekiedy ciemniakowy,
pleśniowiec ciemniakowy,
ospr. ciemniakowy,
zapach patryjowy,
pleśniowiec ciemniakowy.

Objeawy nieszkodliwe - siatkowatość białym, ciemnymi
brzośkami srebrzysto-żółtymi,
ciemne kropki
ciemne, rozmazane, puste.
włosy, sece, niebieskie plamy

choroby brunatki - najczęściej spotykana jest
zapora brunatna. Choroba ta powstaje i roz-
pływa w roślinach uszkodzonych na śnieżym mrozie
długiego pobytu się przestępnym mrozem
jesienią, po okopaniu w jesiennym mrozie
brunatki objawia się to w ten sposób że koronki
młodych drzew brunatka rozrywa. Wzrost i usy-
chają od dołu lub też w górnej polowie. Na zimę
zobacz się rośliny pięknie wsi i wzrasta tym-
czasem wsi i tylko wsi się wsi, liści
i to do pełnego czasu. W tym czasie, szybko
opinie. W tym czasie między brunatki na
śnieżym mrozie.